



операции на желудке, а также вследствие неподходящего или непривычного питания, изменения воды, смены климата и других условий.

**Хилак форте** регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует ее состав. Благодаря содержанию в составе **Хилак форте** продуктов обмена нормальной микрофлоры, препарат способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника биологическим путем и позволяет сохранить физиологические и биологические функции слизистой оболочки кишечника.

Входящие в состав **Хилак форте** биосинтетическая молочная кислота и ее буферные соли восстанавливают нормальное значение кислотности в желудочно-кишечном тракте независимо от того, страдает ли пациент от повышенной или пониженной кислотности.

На фоне ускорения развития нормальных симбионтов кишечника под действием **Хилак форте** нормализуется естественный синтез витаминов группы В и К. Содержащиеся в **Хилак форте** короткоцепочечные летучие жирные кислоты обеспечивают восстановление поврежденной микрофлоры кишечника при инфекционных заболеваниях ЖКТ, стимулируют регенерацию эпителиальных клеток кишечной стенки, восстанавливают нарушенный водно-электролитный баланс в просвете кишки.

Имеются данные о том, что **Хилак форте** усиливает защитные функции организма благодаря стимуляции иммунного ответа.

При применении **Хилак форте** отмечается ускорение выведения сальмонелл у грудных детей после сальмонеллезного энтерита, что обусловлено стимуляцией роста кислотофильной анаэробной кишечной флоры и ее последующим антагонистическим воздействием на сальмонеллы.

#### **Показания к применению:**

- нарушение физиологической флоры тонкого и толстого кишечника (во время и после лечения антибиотиками или сульфаниламидами, лучевой терапии);
- синдром недостаточности пищеварения, диспепсии;
- диарея, метеоризм, запоры;
- гастроэнтерит, колит; синдром старческого кишечника (хронические, атрофические гастроэнтериты);
- расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, вызванные сменой климата;
- гипо- и анацидные состояния;
- энтерогенные заболевания желчного пузыря и печени;
- аллергические кожные заболевания (крапивница, эндогенно обусловленная хроническая экзема);
- сальмонеллез в стадии реконвалесценции (в том числе детей грудного возраста).

**Противопоказания:**

- гиперчувствительность к компонентам препарата;
- дефицит лактазы/изомальтазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата **Хилак форте** в период беременности и лактации считается безопасным. Однако решение о назначении препарата принимает лечащий врач.

**Способ применения и дозы:**

**Хилак форте** принимают внутрь до или во время приема пищи, разбавляя небольшим количеством жидкости (исключая молоко).

Препарат назначают 3 раза в сутки:

- взрослым: по 40-60 капель или 2,2-3,3 мл на прием;
- детям: по 20-40 капель или 1,1-2,2 мл на прием;
- младенцам: по 15-30 капель на прием.

Младенцам рекомендуется использовать препарат во флаконах.

После улучшения состояния суточная доза может быть уменьшена наполовину.

**Побочное действие:**

**Хилак форте** хорошо переносится больными любого возраста.

Побочные действия до настоящего времени не наблюдались.

Возможны аллергические реакции (кожная сыпь, зуд, крапивница); запор, диарея.

**Передозировка:**

Никаких специальных мероприятий за исключением обычного медицинского наблюдения не требуется.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Под влиянием антацидных препаратов возможна нейтрализация молочной кислоты, входящей в состав препарата **Хилак форте**.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:**

Не рекомендуется одновременный прием данного препарата с молоком и молочными продуктами.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не влияет на способность управлять транспортом или заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

**Форма выпуска:**

Капли для приема внутрь.

По 30 мл или 100 мл препарата во флакон темного стекла, укупоренный пробкой-капельницей из полиэтилена и завинчивающейся пластмассовой крышкой с контролем первого вскрытия.

Флакон вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

По 1,1 или 2,2 мл препарата в саше из лакированной ламинированной фольги из полиэтилентерефталата/ алюминия/ полиэтилена. По 15, 30 или 60 саше вместе с инструкцией по применению в картонной пачке.

**Срок годности:**

Флаконы - 4 года.

После вскрытия флакона - 6 недель.

Саше - 2 года.

Не применять по истечении срока годности!

**Условия хранения:**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте!

**Условия отпуска:**

Отпускают без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано РУ:** ратиофарм ГмбХ, Германия

**Производитель:** Меркле ГмбХ,

Доктор Георг-Шпон-Штрассе 7, 89143 Блаубойрен, Германия

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Тева», 115054, Москва, ул. Валовая, 35,

тел.: +7 (495) 644 22 34, факс: +7 (495) 644 22 35/36